

კომბიდვრის დაცვის სქემა



ინსექტიციდი



ფუნგიციდი



ფოთლოვანი მკვებავი

I

ჩითილების გადარგვა

ფესვის სიღამჟლე,
სოკოვანი და ბაქტერიული
დაავადებები,
მავნებლების კომპლექსი

II

6-7 ფოთლის ფაზა

ფიტოფტორა,
ანთრაქნოზი,
ალტერნარიოზი,
ნაცარი

III

ზრდა

ტკიპები, ფრთათრები,
ბუგრები, ნაცარი

IV

კოკრების გამოჩენა

ფიტოფტორა,
ანთრაქნოზი,
ბაქტერიული
დაავადებები

V

ყვავილობის დასაწყისი

ფიტოფტორა,
ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი
სიღამჟლე
ბუგრები, ხვატრები, თრიფსები

რიტმუსი ეკ
0.3ლ/ჰა

ფოსბალ 80
1.2ჰ/ჰა

თეპი 0.3ჰ/ჰა

გერმატი
0.5ლ/ჰა

ა-მიქსურ
ალგასი 1.5ლ/ჰა

ბერმეტინი
0.5/ჰა

რამინი 1.5ჰ/ჰა

ა-მიქსურ
ფლაური 1.5ლ/ჰა

რამინი 30 წდგრ
1.5ჰ/ჰა

მორფო
0.25ლ/ჰა

ბორო პრობალტა
2.0ლ/ჰა

პანკარტ 5 წხ
0.15ჰ/ჰა

გერმატი
0.5ლ/ჰა

კირიქაში
1.0ლ/ჰა

VI

ბუჩქის ფორმირება

ფიტოფტორა,
ანთრაქნოზი,

VII

ნაყოფების ფორმირება

ფიტოფტორა,
ანთრაქნოზი,
ნაცრისფერი სიღამჟლე
ფრთათრები, ტკიპა,
ბუგრები

VIII

ნაყოფების ზრდა

ფიტოფტორა,
ანთრაქნოზი

IX

სიმწიფის დასაწყისი

ფიტოფტორა,
ანთრაქნოზი,
ბაქტერიული
დაავადებები ბუგრები

X

სიმწიფე

ფიტოფტორა,
ანთრაქნოზი,
ბაქტერიული
დაავადებები

ეუკუ
0.3ჰ/ჰა

ფოსბალ კლიუსი
2.0ჰ/ჰა

ა-მიქსურ
Ca 1.5ლ/ჰა

რიტმუსი
0.5ლ/ჰა

აკალონი
0.5ლ/ჰა

კლატინ კაპტან
2.0ჰ/ჰა

განგო ეკ
0.3ლ/ჰა

ფოსბალ კლიუსი
2.0ჰ/ჰა

ა-მიქსური Ca
კლიუსი 1.5ლ/ჰა

პანკარტ 5 წხ
0.15ჰ/ჰა

რამინი 30 წდგრ
2ჰ/ჰა

კინაგოლი
2ლ/ჰა

რამინი 30 წდგრ
2ჰ/ჰა

კლასტოფ L
2ლ/ჰა

გაითვალისწინეთ, რომ სქემა ატარებს ზოგად სარეკომენდაციო ხასიათს. დაავადებების და მავნებლების გავრცელების გათვალისწინებით შესაძლოა გაიზარდოს ან შემცირდეს ნაშრობების დოზირება და ჯერადობა. **დაგვიკავშირდით: +995 598 53 44 00**